

حشره کش های دامی



Pesticides
Producing
Complex

MOSHKFAM FARIS CO.

شرکت شیمیایی مشکفام فارس

تولید کننده سموم دفع آفات نباتی،

دامی و حشره کش های خانگی

شرکت شیمیایی مشکفام فارس

تولید کننده تخصصی نهاده های کشاورزی، دامپروری و خانگی

تأمین کننده کلان، همراه صنعت کشاورزی

شرکت شیمیایی مشکفام فارس در سال ۱۳۷۴ تاسیس و در سال ۱۳۷۶ با بهره برداری از نخستین خط تولید، فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. این مجموعه با تکیه بر استراتژی (توسعه مس——تمر)، به یکی از تأمین کنندگان کلیدی بازار داخلی تبدیل شده و سهم قابل توجهی از نیاز کشور را پوشش می دهد.

زیرساخت های صنعتی و توان تولید

رویکرد توسعه محور مشکفام فارس موجب شده است تا این شرکت اکنون با بهره گیری از **خط تولید فعال و ماشین آلات پیشرفته** میتنی بر فناوری های روز **اروپا، هندوستان و ایران**، ظرفیت عملی خود را به سطح استانداردهای بین المللی ارتقا دهد.

سبد محصولات؛ تنوع و کیفیت

تنوع بخشی به محصولات، همراه الویت استراتژیک این مجموعه بوده است. سبد کالایی مشکفام فارس با شامل شدن بیش از **۱۰۰ نوع محصول متنوع** در حوزه های ذیل پاسخگوی نیازهای تخصصی فعالان این عرصه هاست:

• سموم دفع آفات نباتی و کشاورزی

• محصولات تخصصی حوزه دامپروری

• محصولات پودری و مایعات خانگی

توسعه زنجیره تأمین؛ گامی به سوی آینده

در راستای تکمیل سبد کالا و ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی، از سال ۱۴۰۱ حوزه **تولید و واردات کودهای شیمیایی** نیز به فعالیت های تخصصی مجموعه افزوده شد تا زنجیره تأمین نهاده ها برای مشتریان کامل تر شود.

مشکفام فارس، شریک قابل اعتماد شما



امضای دیجیتال کارخانه، تعهد ارتباط مستقیم و روزانه تیم فنی کارخانه با شما. لطفا روزانه اسکن کنید تا از خدمات مشتریان ویژه بهره مند شوید.

سایپر مترین

CYPERMETHRIN 10% EC

حجم
خالص
الیترا



%۱۰ امولسیون

ضد انگل خارجی دام و طیور از گروه ، Pyrethroid علیه
انواع (کنه ، مایت ، مگس ، شپش ، جرب)

• درجه سمیت:

Acute oral LD ۵۰ for rate: ۲۵۰-۴۱۵۰ mg/kg

• نحوه مصرف:

مصرف به صورت اسپری: محلول سم را تا مرحله خیس
شدن کامل، به سطح بدن حیوان بپاشید.

حمام کنه گاوی: هر گاو را به مدت ۱۵ ثانیه در حمام کنه
غوطه ور سازید و سر آن را نیز سه مرتبه در زیر محلول فرو
ببرید.

حمام کنه گوسفندی: استفاده از حمام کنه ترجیحاً باید ۳-
۴ هفته پس از پشم چینی، زمانی که خراشهای ناشی از پشم
چینی بهبود یافته و پشم ها ۴ - ۲ سانتیمتر رشد کرده
باشند صورت گیرد. هر گوسفند را ۳۰ ثانیه در محلول
نگهدارید و سر آن را یک یا دو بار زیر محلول فرو ببرید.

• روش تهیه محلول:

ابتدا میزان مورد نیاز از سم را مطابق جدول بالا ، در ۳ تا ۵
لیتر آب ریخته و خوب بهم بزنید، سپس آن را به حجم مورد
نیاز آب حمام یا مخازن اسپری اضافه کنید تا امولسیون
آماده گردد.

دام هایی که ســن کمتر از ۴ هفته دارند باید جداگانه و
تحت مراقبت کامل حمام یا اسپری داده شوند. از حمام
دادن دام های ضعیف، خسته و تشنه جدا خودداری کنید.
این سم برای زنبور عسل و ماهیان خطرناک است.

• دوره پرهیز از مصرف شیر و گوشت: یک هفته

طریقه و میزان مصرف:

گاو	اسپری	کلیه	۱ سی سی در یک لیتر آب	علیه کنه یک میزبان به بعد از ۵-۴ هفته
	حمام	کلیه انگل ها	محلول اولیه: ۱ سی سی در یک لیتر آب محلول مجدد: ۱ سی سی در ۱۰۰۰-۶۰۰ سی سی	
گوسفند و بز	حمام یا اسپری	شپش	۱ سی سی در ۵-۱۰ لیتر آب	یک بار مصرف کافی است در صورت نیاز بعد از ۳ هفته تکرار شود
	حمام	جرب	محلول اولیه: ۱ سی سی در یک لیتر آب	در صورت نیاز بعد از یک هفته تکرار شود

طریقه و میزان مصرف در طیور، دامداری ها و مرغداری ها


طیور	اسپری بدن	ماییت و شپش	۱ سی سی در ۱۰۰۰-۵۰۰ سی سی آب
دامداری و مرغداری	اسپری کف و دیوارها		۵۰ سی سی در ۵ تا ۱۰ لیتر آب

www.moshkfamfars.com

دلتامترین

DELTA METHRIN 5% EC

حجم
خالص
الیترا



طریقه و میزان مصرف:

۵٪ امولسیون

ضد انگل از گروه Pyrethroid بر علیه (کنه، مایت، مگس، شپش، جرب)

• درجه سمیت:

Acute oral LD ۵۰ for rate: ۱۳۵-۵۰۰۰ mg/kg

• نحوه مصرف:

مصرف به صورت اسپری: محلول سم را تا مرحله خیس شدن کامل، به سطح بدن حیوان پاشید.

حمام کنه گاوی: هر گاو را به مدت ۱۵ ثانیه در حمام کنه غوطه ور سازید و سر آن را نیز سه مرتبه در زیر محلول فرو ببرید.

حمام کنه گوسفندی: استفاده از حمام کنه ترجیحاً باید ۳-۴ هفته پس از پشم چینی، زمانی که خراشهای ناشی از پشم چینی بهبود یافته و پشم ها ۴-۲ سانتیمتر رشد کرده باشند صورت گیرد. هر گوسفند را ۳۰ ثانیه در محلول نگهدارید و سر آن را یک یا دوبار زیر محلول فرو ببرید.

• روش تهیه محلول:

ابتدا میزان مورد نیاز از سم را مطابق جدول زیر، در ۳ تا ۵ لیتر آب ریخته و خوب بهم بزنید، سپس آن را به حجم مورد نیاز حمام یا مخازن اسپری اضافه کنید تا امولسیون آماده گردد.

دام هایی که سن کمتر از ۴ هفته دارند باید جداگانه و تحت مراقبت کامل حمام یا اسپری داده شوند. از حمام دادن دام های ضعیف، خسته و تشنه جدا خودداری کنید. این سم برای زنبور عسل و ماهیان خطرناک است.

• **دوره پرهیز از مصرف شیر و گوشت:** مصرف شیر گاو ممنوعی ندارد، شیر گوسفند و بز برای مصارف انسانی مناسب نیست. گوشت گاو ۳ روز و گوشت گوسفند و بز ۴ روز مصرف نگردد.

گاو و گوسفند و بز	اسپری	کنه و مگس	۵/۵ سی سی در ۱۰۰۰ سی سی آب تکرار درمان کنه چند میزبان ۱۰ تا ۱۲ روز بعد برای کنه تک میزبان ۴ تا ۵ هفته بعد برای مگس ۶ تا ۸ هفته بعد
		شپش و مگس بدون بال گوسفند و بز گوسفند	۲۵/۵ سی سی در ۱۰۰۰ سی سی آب
حمام	جرب	جرب	۱ سی سی در ۱ لیتر آب
		کنه و مگس	۵/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب
		شپش و مگس بدون بال گوسفند و بز	۲۵/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب
گاو و گوسفند و بز	اسپری	جرب	۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب
		کنه و مگس	۵/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب
گاو و گوسفند و بز	حمام	شپش و مگس بدون بال گوسفند و بز	۲۵/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب
		جرب	۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب

دلتامترین

DELTAMETHRIN 5% SC

حجم
خالص
الیترا



گاهی بزرگ به سوی سموم میکروکپسوله

این شرکت با در نظر داشتن تکنولوژی های روز در دنیا در مسیر فرمولاسیون سموم میکروکپسوله آهسته رهش، به فرمولاسیون نوین و بی همتای آب پایه دلتامترین رسیده است. دلتامترین ۵٪ سوسپانسیون؛ نسل جدید سموم آهسته رهش برای دام و طیور می باشد.

فرمولاسیون منحصربه فرد این محصول با بهره گیری از تکنولوژی سوسپانسیون یون آب پایه با دارا بودن ریزساختارهای پایدار، امکان رهش آسته و تدریجی دلتامترین را در محیط دامداری فراهم می کند.

● **عملکرد پایدار و اثربخشی طولانی:** با توضیح یکنواخت ماده مؤثره در ساختارهای میکرونی و همچنین ایجاد یک لایه محافظتی ضخیم بر روی سطوح دامداری و بدن دام، سم به صورت تدریجی آزاد می شود و از هجوم انگل ها تا یک فصل دامداری محافظت می کند.

● **ایمنی بالا:** به دلیل حذف حلالیت های حساسیت زا، این محصول حتی در محیط های بسته همانند مرغداری ها، مزارع و حتی در حضور حیوانات خانگی ایمن است.

● **تفاوت محسوس با سموم معمولی:** رهش آهسته و کنترل شده دلتامترین باعث ماندگاری اثر، کاهش نیاز به تکرار مصرف و حفظ سلامت دام می شود.

● **نتیجه:** این محصول، ساختار SC بارفتر آهسته رهش را در بازار ایران به وجود آورده و تجربه ای متفاوت و علمی از کنترل انگل ها ارائه می دهد.

معادل این محصول در دنیا سم Suspend شرکت Bayer می باشد.


طریقه و میزان مصرف:

گاؤ و گوسفند و بز	اسپی	کنه و مگس	۵/۰ سی سی در ۱۰۰۰ سی سی آب تکرار درمان کنه چند میزبان ۱۰ تا ۱۲ روز بعد برای کنه تک میزبان ۴ تا ۵ هفته بعد برای مگس ۶ تا ۸ هفته بعد
	حمام	کنه و مگس	۵/۰ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب ۲۵/۰ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب ۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب
گاؤ و گوسفند و بز	حمام	شپش و مگس بدون بال	۲۵/۰ سی سی در ۱۰۰۰ سی سی آب
		جرب	۱ سی سی در ۱ لیتر آب
		کنه و مگس	۵/۰ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب
گاؤ و گوسفند و بز	حمام	شپش و مگس بدون بال	۲۵/۰ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب
		جرب	۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب
		کنه و مگس	۵/۰ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب

فوکسیم

PHOXIM 50% EC

حجم
خالص
الیترا



۵۰٪ امولسیون

این سم با کاهش کولین استراز خون از طریق سیستم گوارش و یا تماس اثر می کند.

• درجه سمیت:

Acute oral LD ۵۰ for rate: ۲۰۰۰ mg/kg

• نحوه مصرف:

بهترین اثر درمانی و ابقایی وقتی است که کلیه سطوح جلد دام در حمام کاملاً خیس شود، ضمناً امولسیون آماده شده را با پستی ظرف مدت ۲ روز مصرف نمود. برای جبران سم از دست رفته در حمام به ازاء هر ۱۰۰ لیتر آب ۲۰۰ میلی لیتر سم اضافه نمایید. در مورد جرب ها ۸ تا ۱۰ روز بعد، درمان را تکرار نمایید. به منظور افزایش اثر بخشی سم جایگاه دام را نیز سمپاشی کنید.

• موارد مصرف:

برای کنترل مایت های جرب (پزوروپتس، سارکوپتس) شپش های مکنده و گزنده، مگس ها، کنه گوسفندی، کنه ها و لارو مگس در زخم ها

• **دوره پرهیز از مصرف شیر و گوشت:** شیر تولید شده را نباید در ۲۴ ساعت اول پس از درمان به مصرف انسانی رساند. در مورد نسوج این مدت برابر ۴ هفته است. لذا در دام هایی که ظرف یک ماه آینده روانه کشتارگاه می شوند از مصرف سم خودداری شود.

• طریقه و میزان مصرف:

ابتدا میزان مورد نیاز سم را در ۳ تا ۵ لیتر آب ریخته و خوب بهم بزنید، سپس آن را به حجم مورد نیاز آب حمام اضافه کنید تا امولسیون آماده گردد. مقدار مصرف مطابق جدول زیر است.

طریقه و میزان مصرف:

انگل جلدی	میزان مصرف	غلظت ماده موثره
جرب ها: (سارکوپتس، پزوروپتس، کوریوپتس) شپش های مکنده و گزنده: دامالینا، لینوگناتوس، بووی کولا، همتاپینوس، ملوفاگوس	۱۰۰ میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب	۰/۰۵٪
میزاهای ثانویه	۵۰-۱۰۰ میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب	۰/۰۵٪ - ۰/۰۲۵٪
انواع کنه ها	۵۰-۱۰۰ میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب	۰/۰۵٪ - ۰/۰۲۵٪

پروپوکسور

PROPOXUR %1

حجم
خالص
۷۵ گرم



طریقه و میزان مصرف:

پودر قابل پاشش ۱٪

از گروه کاربامات ها ضد انگل خارجی، کاربامات ها نیز مانند ترکیبات ارگانو فسفره، از طریق مهار فعالیت کولین استراز و در نتیجه تجمع استیل کولین موثر واقع می شوند. این سم بصورت تماسی و گوارشی عمل می نماید.

موارد مصرف:

کنترل انگل های جلدی طیور، حیوانات اهلی و خانگی بخصوص سگ و گربه

میزان و طریقه مصرف:

پودر را به مقدار کم روی تمام سطح بدن پاشید، سپس در جهت خلاف موها پا پرها تار سیدن پودر به سطح پوست مالش دهید. درمان نسبت به شدت هجوم انگل های جلدی و میزان پودر پاشی ۱ تا ۲ بار در هفته تکرار شود. برای جلوگیری از آلودگی مجدد همزمان ترجیحاً محل نگهداری حیوانات را نیز با یک سم مایع مخصوص جایگاه سمپاشی کنید. برای درمان موثر پودر را روی سطوح آهکی و قلیایی نپاشید.

زمان پرهیز از مصرف فرآورده های دامی: بلافاصله پس از سمپاشی می توان از شیر و گوشت دام استفاده نمود.

توجه:

موارد عدم مصرف: از استفاده این دارو برای حیواناتی که به دیگر بیماری ها مبتلا هستند خود داری کنید. از مصرف همزمان این محصول با سایر ضد انگل های جلدی اجتناب ورزید.

حلالیت پروپوکسور در آب زیاد است. این سم در خاک با دوام است و به مدت ۲-۳ ماه پایدار باقی می ماند.

برای زنبور عسل سمی و خطر ناک است.

تکرار درمان نسبت به شدت هجوم انگل یک تا دوبار در هفته	۳۰ تا ۴۰ گرم	انگل جلدی طیور
تکرار درمان نسبت به شدت هجوم انگل یک تا دو بار در هفته	۳۰ تا ۴۰ گرم	انگل جلدی حیوانات اهلی خانگی (سگ و گربه)

پروپتامفوس

PROPETAMPHOS 35% EC

حجم
خالص
الیترا



۳۵٪ امولسیون

با طیف گسترده برای کنترل انگل های جلدی دام ها با تاثیر عالی علیه کنه، جرب، شپش، کک و مگس

• درجه سمیت:

Acute oral LD ۵۰ for rate: ۲۰۰۰ mg/kg

• نحوه مصرف:

مصرف به صورت اسپری: محلول سم را تا مرحله خیس شدن کامل، به سطح بدن حیوان بپاشید.

حمام کنه گاوی: هر گاو را به مدت ۱۵ ثانیه در حمام کنه غوطه ور سازید و سر آن را نیز سه مرتبه در زیر محلول فرو ببرید، گاوهایی را که کمتر از سه ماه سن دارند نباید وارد حمام کرد و یا با محلول آماده اسپری نمود.

حمام کنه گوسفندی: استفاده از حمام کنه ترجیحا باید ۳-۴ هفته پس از پشیم چینی، زمانی که خراش های ناشی از پشیم چینی بهبود یافته و پشم ها ۴-۲ سانتیمتر رشد کرده باشند صورت گیرد. هر گوسفند را ۳۰ ثانیه در محلول نگهدارید و سر آن را یک یا دو بار زیر محلول فرو برید.

• دوره پرهیز از مصرف شیر و گوشت:

شیر تولید شده را نباید در ۲۴ ساعت اول پس از درمان به مصرف انسانی رساند، در مورد نسوج این مدت برابر ۲ هفته است، لذا در دام هایی که ظرف ۲ هفته آینده روانه کشتارگاه می شوند از مصرف سم خودداری شود.

• طریقه ساخت و میزان مصرف:

ابتدا میزان مورد نیاز سم را با توجه به جدول در ۳ تا ۵ لیتر آب ریخته و خوب بهم بزنید، سپس آن را به حجم مورد نیاز آب حمام یا مخازن مخصوص اسپری اضافه کنید تا امولسیون آماده گردد. مقدار مصرف مطابق جدول زیر است.


طریقه و میزان مصرف:

دام	نوع انگل	روش مصرف سم	نسبت رقیق کردن سم در آب
گاو	کنه	حمام	۱ لیتر در ۵۰۰ لیتر آب پس از کاهش ۱۰٪ از حجم اولیه: ۱ لیتر در ۵۰۰ لیتر آب
		دوش (اسپری) اتوماتیک ثابت	۱ لیتر در ۵۰۰ لیتر آب پس از کاهش ۱۰٪ از حجم اولیه: ۱ لیتر در ۵۰۰ لیتر آب
		اسپری دستی	۱۵ سی سی در ۱۰ لیتر آب برای هر دام حداقل ۲ لیتر از محلول فوق مصرف شود.
گوسفند	جرب، شپش، کک	اسپری	۶ سی سی در ۱۰ لیتر آب
	جرب، کک، کنه (مگس بی بال)	حمام	۳۰۰ سی سی در ۵۰۰ لیتر آب پس از کاهش ۱۰٪ از حجم اولیه: ۳/۰ لیتر در ۵۰۰ لیتر آب
	کنه، مگس	حمام	۶۰۰ سی سی در ۵۰۰ لیتر آب پس از کاهش ۱۰٪ از حجم اولیه: ۶/۰ لیتر در ۵۰۰ لیتر آب
	مگس (برای پیشگیری از استقرار روی بدن دام)	اسپری	۱ لیتر سم در ۵۰۰ لیتر آب برای هر دام حداقل ۴ لیتر از محلول فوق مصرف شود.
	مبارز جلدی (لارو، مگس روی بدن)	درمان موضعی	۴ سی سی در یک لیتر آب (برای هر موضع آلوده ۱۰۰ سی سی از محلول فوق)
گاو	جرب، شپش، کک، کنه	اسپری	۶ سی سی سم در ۱۰ لیتر آب

لامبدا-سای هالوترین

Lambda-Cyhalothrin 5%EC

حجم
خالص
الیترا



۵٪ امولسیون

ضد انگل از گروه Pyrethroid، موثر علیه (کنه، مایت، شپش، جرب).

• درجه سمیت:

Acute Oral LD₅₀ for Rats: 114-124 mg/kg

• نحوه مصرف:

به صورت اسپری: محلول سم را تا مرحله خیس شدن کامل به سطح بدن حیوان بپاشید.

حمام کنه گاوی: هر گاو را به مدت ۱۵ ثانیه در حمام کنه غوطه ور سازید و سر آن را نیز سه مرتبه به زیر محلول فرو ببرید.

حمام کنه گوسفندی: استفاده از حمام کنه ترجیحا باید ۴-۳ هفته پس از پشم چینی، بهبود یافته و پشم ها ۴-۲ سانتیمتر رشد کرده باشند. هر گوسفند را ۳۰ ثانیه در محلول نگه دارید و سر آن را یک یا دو بار به زیر محلول فرو ببرید.

• **روش تهیه محلول:** ابتدا میزان مورد نیاز از سم را مطابق جدول زیر، در ۳ تا ۵ لیتر آب ریخته و خوب به هم بزنید. سپس آن را به حجم مورد نیاز حمام یا مخازن اسپری اضافه کنید تا محلول امولسیون آماده گردد.

دام هایی که سن کمتر از ۴ هفته دارند باید جداگانه و تحت مراقبت کامل حمام یا اسپری داده شوند. از حمام دادن دام های ضعیف، خسته و تشنه جدا خودداری کنید. این سم برای زنبور عسل و ماهیان خطرناک است.

• **دوره پرهیز از مصرف شیر و گوشت:** مصرف شیر گاو و گوسفند سه الی پنج روز، گوشت گاو سه روز و گوشت گوسفند و بز پنج روز.

طریقه و میزان مصرف:

گاو	اسپری	کلیه انگل ها	۱ سی سی در یک لیتر آب	علیه کنه یک میزبان بعد از ۴ الی ۵ هفته علیه کنه چند میزبان بعد از ۱۵ الی ۱۹ روز
گوسفند و بز	حمام	کلیه انگل ها	محلول اولیه: ۱ سی سی در یک لیتر آب محلول مجدد: ۱ سی سی در ۶۰۰ الی ۱۰۰۰	-----
گوسفند	حمام یا اسپری	شپش	۱ سی سی در ۵ الی ۱۰ لیتر	یک بار مصرف کافی است در صورت نیاز ۳ هفته بعد تکرار شود.
د و بز	حمام	جرب	محلول اولیه: ۱ سی سی در یک لیتر آب محلول مجدد: ۱ سی سی در ۸۰۰ سی سی	در صورت نیاز یک هفته بعد تکرار شود.

پرمترین

Permethrin 10%EC

حجم
خالص
الیترا



٪۱۰ امولسیون

ضدانگل از گروه Pyrethroid سنتزی، موثر علیه (کنه، مایت، شپش، جرب). ماندگاری بالا **مناسب جهت سمپاشی جایگاه.**

• درجه سمیت:

Acute Oral LD ۵۰۰ for Rats: ۵۰۰-۱۵۰۰ mg/kg

• نحوه مصرف:

به صورت اسپری: محلول سم را تا مرحله خیس شدن کامل به سطح بدن حیوان پاشید. به منظور نتیجه گیری بهتر می توان پس از کود رویی، محلول را پس از آماده سازی به وسیله سمپاش به سراسر دیواره ها و کف جایگاه نگهداری دام ها اسپری کنید و سپس دامها را به جایگاه بازگردانید.

حمام کنه گاوی: هر گاو را به مدت ۱۵ ثانیه در حمام کنه غوطه ور سازید و سر آن را نیز سه مرتبه به زیر محلول فرو ببرید.

حمام کنه گوسفندی: استفاده از حمام کنه ترجیحا باید ۳-۴ هفته پس از پشیم چینی، بهبود یافته و پشیم ها ۲-۴ سانتیمتر رشد کرده باشند. هر گوسفند را ۳ ثانیه در محلول نگه دارید و سر آن را یک یا دو بار به زیر محلول فرو ببرید.

• **روش تهیه محلول:** ابتدا میزان مورد نیاز از سم را مطابق جدول زیر، در ۳ تا ۵ لیتر آب ریخته و خوب به هم بزنید. سپس آن را به حجم مورد نیاز حمام یا مخازن اسپری اضافه کنید تا محلول امولسیون آماده گردد.

دام هایی که سن کمتر از ۴ هفته دارند باید جداگانه و تحت مراقبت کامل حمام یا اسپری داده شوند. از حمام دادن دام های ضعیف، خسته و تشنه جدا خودداری کنید. این سم برای زنبور عسل و ماهیان خطرناک است.

• **دوره پرهیز از مصرف شیر و گوشت:** مصرف شیر گاو و گوسفند ده روز، گوشت گاو یک هفته و گوشت گوسفند و بز: ده روز.

طریقه و میزان مصرف:

اسپری	کلیه انگل ها	۱ سی سی در یک لیتر آب	علیه کنه یک میزبان بعد از ۴ الی ۵ هفته
حمام	کلیه انگل ها	محلول اولیه: ۱ سی سی در یک لیتر آب	-----
حمام یا شپش		۱ سی سی در ۵ الی ۱۰ لیتر	یک بار مصرف کافی است
حمام جرب		محلول اولیه: ۱ سی سی در یک لیتر آب	در صورت نیاز یک هفته بعد تکرار شود.


طریقه و میزان مصرف در سمپاشی جایگاه دام و مرغداری ها:

مرغداری	اسپری	کف و دیواره ها	هایت و شپش (سمپاشی در بین دوره)	۱ سی سی در ۵۰۰-۱۰۰۰ سی سی آب
دامداری	اسپری	کف و دیواره ها	کک ماندگار در دامداری، شپش و جرب (پس از کود رویی)	۱۰۰ سی سی در ۵ الی ۱۰ لیتر آب

سایپرکر (سایپرمتترین پورآن)

Cypermethrin 2.5% RTU(Pouron)

حجم
خالص
۵۰۰ میلی
لیتر



۲/۵٪ محلول آماده مصرف (کمری)

ضدانگل جلدی از گروه Pyrethroid، موثر علیه (کنه، مگس، شپش، جرب). استفاده آسان و سریع، مقرون به صرفه و ایمن.

• درجه سمیت:

Acute Oral LD₅₀ for Rats: ۲۵۰-۴۵۰ mg/kg

• نحوه صحیح استفاده از محصول

در صورت نیاز به مصرف حجم بالا: درب اصلی بطری را باز کرده و به محتویات کامل محصول دسترسی داشته باشید.

در صورت تعادل به سم ریزی با استفاده از پیمانه مدرج تعبیه شده روی بطری: ابتدا درب اصلی بطری را به طور کامل و محکم ببندید. درب پیمانه را باز نمایید. با اعمال فشار ملایم دست به بدنه بطری (مطابق شکل)، مقدار مورد نیاز از محصول از طریق مسیر انتقال به داخل پیمانه منتقل شود. پس از رسیدن به حجم مورد نظر، محتویات پیمانه را مطابق تصویر، به صورت یکنواخت بر روی کمر دام بریزید. در صورت شدت آلودگی می توانید یک مرتبه دیگر این کار را انجام دهید و یک خط نیم هلال نیز از یک برجستگی لگن تا سمت دیگر مطابق شکل زیر بریزید.

مناسب برای فصول سرد سال که امکان حمام دام وجود ندارد. این سم برای زنبور عسل و ماهیان خطرناک است. از این محصول می توان به منظور پیشگیری قبل از شیوع آلودگی نیز استفاده نمود.

دوره پرهیز از مصرف شیر و گوشت: مصرف شیر گاو و گوسفند یک روز، دوره مصرف از گوشت ندارد.

• روش مصرف:



۱- ضمن بکارگیری وسائل احتیاطی، ابتدا درب قسمت مدرج ظرف را باز کنید.



۲- بدنه بطری را به آرامی فشار دهید تا به اندازه توصیه شده از محلول وارد قسمت مدرج شود. با توجه به علائم روی قسمت مدرج مقدار ورود محلول را کنترل نمایید.



۳- با کج کردن بطری، مقدار محلول ورودی به قسمت مدرج را به صورت یکنواخت روی پشت دام از سر تا دم بریزید.

طریقه و میزان مصرف:

گاو	سم ریزی خطی روی کمر	کک، کنه، جرب، شپش، مگس، پشه	۱۰ سی سی به ازای هر ۵۰۰ کیلوگرم وزن بدن
گوسفند و بز	سم ریزی خطی روی کمر	کک، کنه، جرب، شپش، مگس، پشه	۷ سی سی به ازای هر ۵۰ کیلوگرم وزن بدن

در صورت شدت زیاد آلودگی، میتوان سم ریزی را دو هفته بعد تکرار نمود.

www.moshkfamfars.com

NEW
جدید

۱٪ محلول آماده مصرف (کمری)

ضدانگل جلدی از جدیدترین اعضای گروه، Pyrethroid، موثر علیه (کک، کنه، مگس، شپش، جرب) در گاو، گوسفند، بز، اسب و سگ ها. استفاده آسان و سریع، مقرون به صرفه و ایمن.

● **درجه سمیت:**

Acute Oral LD ۵۰ for Rats: ۴۱-۳۸۴۹ mg/kg

● **نحوه مصرف:**

به صورت سم ریزی یا نقطه گذاری روی کمر: ابتدا درب سم پیمانه را باز نموده و بطری را فشار دهید تا به میزان مورد نیاز وارد پیمانه تعبیه شده در بطری گردد. سپس درب سم پیمانه را محکم کنید و محلول آماده مصرف را به صورت یک خط از پشت گردن تا دم دام به صورت یک خط صاف بریزید، در صورت شدت آلودگی می توانید یک مرتبه دیگر این کار را انجام دهید و یک خط نیم هلال نیز از یک برجستگی لگن تا سمیت دیگر مطابق شکل زیر بریزید. مناسب برای فصول سرد سال که امکان حمام دام وجود ندارد.

در سگها می توان به صورت قطراتی در ریشهای موها بین دو کتف چکاند.

این سم برای زنبور عسل و ماهیان خطرناک است. از این محصول می توان به منظور پیشگیری قبل از شیوع آلودگی نیز استفاده نمود.

● **دوره پرهیز از مصرف شیر و گوشت:** مصرف شیر گاو و گوسفند یک روز، دوره مصرف از گوشت ندارد.

فلوکر (فلو مترین پوران)

Flumethrin 1% RTU (Pouoran)

حجم
خالص
۵۰۰ میلی
لیتر



طریقه و میزان مصرف:

گاو	سم ریزی خطی روی کمر	کک، کنه، جرب، شپش، مگس، پشه	۱۰ سی سی به ازای هر ۵۰۰ کیلوگرم وزن بدن
گوسفند و بز	سم ریزی خطی روی کمر	کک، کنه، جرب، شپش، مگس، پشه	۷ سی سی به ازای هر ۵۰ کیلوگرم وزن بدن
اسب	سم ریزی خطی روی کمر	کک، کنه و جرب	۵ سی سی به ازای هر ۲۰۰ کیلوگرم وزن بدن
سگ	قطره چکانی بین دو کتف	کک، کنه و جرب	۵ قطره به ازای هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن

در صورت شدت زیاد آلودگی، میتوان سم ریزی را دو هفته بعد تکرار نمود.

نمک حمام پرنده

Avian Bath Salt 1% RTU

حجم
خالص
۱ کیلوگرم



تحت لیسانس کشور آلمان، محصول مشترک با شرکت امید آفرید البرز

۱٪ پودر مخلوط شونده در آب

علیه انگل های جلدی پرندگان، ترکیبی از دو حشره کش پاپروتیروئید (پرمترین و سایپرمتترین) و سینترزیست موثر که با وجود درصد بسیار کم حشره کش های مورد استفاده در این محصول، در عین امنیت و سلامت پرندگان کارایی محصول را بسیار زیاد میکند.

نابود کننده حشرات خونخوار پرندگان و توصیه شده به خصوص در هنگام پرریزی.

نحوه مصرف:

۲ گرم از محصول را در یک لیتر آب حل نمائید و در دسترس پرنده به منظور آب تنی و حمام بگذارید.

این سم برای زنبور عسل، ماهیان و گربه ها خطرناک است. از این محصول می توان به منظور پیشگیری قبل از شیوع آلودگی نیز استفاده نمود.

قابل استفاده برای کبوتر ها و پرندگان زینتی، جهت استفاده در طیور و مرغداری ها با دامپزشک مشورت شود.

توجه:

این محصول حاوی پرمترین، سایپرمتترین و پیپروئیل بوتوکساید است. از نوشیدن محصول به شدت خودداری شود. برای کاسکو و مرغ مینا استفاده نشود. در طوطی سانان فقط حمام ارادی با زمان بسیار کوتاه مجاز است.

در صورت مشاهده بی تعادلی، بی حالی، لرزش یا پرآرایی غیر طبیعی، بدن پرنده را با آب فراوان شسته و فوراً به دامپزشک مراجعه شود.

پرنده	وضعیت مصرف	دوز نهایی	زمان حمام	تکرار	روش مصرف
کبوتر	مجاز	۲ گرم در لیتر	۱۰-۵ دقیقه	هفته ای یکبار	ظرف حمام - حمام ارادی
فنج	مجاز با احتیاط	۲ گرم در لیتر	۴-۳ دقیقه	هر ۱۰ روز	ظرف کوچک - بدون اجبار
قناری	مجاز با احتیاط	۲ گرم در لیتر	۵-۳ دقیقه	هر ۱۰-۱۴ روز	نظارت کامل
مرغ عشق	مجاز با احتیاط زیاد	۲ گرم در لیتر	۴-۳ دقیقه	هر ۲ هفته	اگر بی قراری دیدید فوراً خارج شود
عروس هلندی	مجاز با احتیاط بسیار زیاد	۲ گرم در لیتر	۵-۳ دقیقه	هر ۲-۳ هفته	زمان کوتاه، فقط حمام ارادی
طوطی سان کوچک	مجاز با احتیاط بسیار زیاد	۲ گرم در لیتر	۵-۳ دقیقه	هر ۲-۳ هفته	زیر نظارت بدون غوطه ور کردن
مرغ مینا	منع مصرف	-	-	-	اصلاً استفاده نشود
کاسکو	منع مصرف کامل	-	-	-	استفاده ممنوع

MOSHKFAM FARS CHEMICAL Co.



www.moshkfamfars.com

کارخانه : شیراز، شهر صنعتی آب باریک، خیابان بنفشه تلفن: ۰۷۱ - ۳۲۶۰۲۰۸۵ - ۰۷۱

اداره فروش : ۰۷۱ - ۳۲۶۰۲۰۸۵ - ۳۲۶۰۲۰۸۳ - دفتر تهران : ۰۲۱ - ۸۸۰۵۸۵۶۱ - ۴

آدرس دفتر تهران: خیابان شیخ بهایی شمالی/خیابان سلمان/پلاک ۱۹/طبقه ۲

E-mail: info@moshkfamfars.com